

# СПЕЙФЛЮ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

**Торговое название:** Спейфлю

**Лекарственная форма:** таблетки покрытые пленочной оболочкой

**Состав:** каждая таблетка содержит:

Парацетамол	200 мг;
Аскорбиновая кислота	150 мг;
Кофеин	25 мг;
Хлорфенирамин	2,5 мг.

**Читайте инструкцию внимательно, потому что она содержит важную информацию.**

Настоящее лекарство отпускается без рецепта и предназначено для лечения не сложных заболеваний, для которых не нужен совет врача. Для более высокой эффективности, препарат следует применять с осторожностью. Сохраните инструкцию по применению. Может Вам необходимо будет заново прочитать ее. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту.

**В этой брошюре:**

1. Что такое Спейфлю и для чего он используется.
2. Перед применением препарата Спейфлю.
3. Как принимать Спейфлю.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Спейфлю.
6. Дополнительная информация.

### **1. Что такое Спейфлю и для чего он используется**

Спейфлю - это комбинация парацетамола, аскорбиновой кислоты (витамин С), кофеина и хлорфенирамин малеата.

Парацетамол направлен на снятие боли и снижение высокой температуры тела. Кофеин стимулирует и облегчает действие парацетамола. Аскорбиновая кислота относится к группе водорастворимых витаминов. Функционирует в комбинации в дополнение с витамином С, потому что его концентрация уменьшается в период инфекции. Хлорфенирамин уменьшает секрецию носовой полости и отек слизистой оболочки носа, а также расслабляет мышцы бронхов.

Спейфлю принимают для облегчения основных симптомов простуды и гриппа (повышение температуры тела, головная боль, боли в суставах и мышцах, повышенное слезотечение, повышение секреции носа, чихание).

### **2. Рекомендации перед применением препарата Спейфлю**

Не принимайте Спейфлю если у вас:

- аллергия на парацетамол, аскорбиновую кислоту, кофеин, малеат хлорфенирамина или на любой из других ингредиентов;
- есть серьезные нарушения функции почек;
- есть серьезные нарушения печени;
- вы беременны или кормите грудью.

Не давать детям до 12 лет.

С осторожностью принимать людям со следующими заболеваниями:

- почечная или печёночная недостаточность;
- синдром Гилберта (наследственная болезнь, при которой концентрация билирубина в крови повышена);
- эпилепсия, глаукома (повышенное внутриглазное давление), диабет, болезни щитовидной железы, увеличение простаты, пилорическая-дуоденальная непроходимость (сложность прохождения контента через желудок или начальную часть тонкой кишки), болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;
- есть предрасположенность к образованию почечных камней, так как при приёме больших доз Спейфлю, аскорбиновая кислота может привести к образованию камней в почках;
- болезни, при которых в организме количество железа выше нормы (гемохроматоз, талассемия, сидеробластная анемия, глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа);
- алкогольная зависимость;
- расстройство, беспокойство, высокое кровяное давление или нарушение сердцебиения, бессонница или дрожь.

Не принимать препарат одновременно с алкоголем или другими препаратами, содержащими парацетамол.

С осторожностью принимать у детей старше 12 лет.

### **3. Как принимать Спейфлю.**

Прием Спейфлю с едой и напитками:

Возможно принятие препарата с или без пищи.

Не следует принимать с алкогольными напитками. Одновременное применение парацетамола с алкоголем может увеличить вероятность повреждения печени.

Избегать прием напитков, содержащих кофеин, так как это может вызвать нервозность и учащенное сердцебиение.

### **Беременность и кормление грудью:**

Проконсультироваться с лечащим врачом или обратиться к фармацевту за советом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

Сообщите врачу, если вы беременны или есть подозрения на беременность.

Не рекомендуется использование при беременности и кормлении грудью.

### **Влияние на управление транспортными средствами или автомобилем:**

Спейфлю может вызвать сонливость, поэтому следует быть осторожным во время управления транспортом или при работе с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пожалуйста, обратите внимание, что данная информация может быть применена к тем препаратам, которые были приняты в прошлом, или будут приниматься в будущем.

Пожалуйста, расскажите лечащему врачу, если вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе лекарственные средства, полученных без рецепта.

Сообщите врачу, если вы одновременно с Спейфлю принимаете любой из следующих лекарственных средств: лекарства, которые снижают свертывание крови (*например, варфарин*) - может привести к риску кровотечения; *метоклопрамид, домперидон* - увеличивают поглощение парацетамола; *хлорамфеникол* - парацетамол продлевает период полураспада и устранение хлорамфеникола; *противозлептические, барбитураты, рифампицин* - есть риск повреждения печени; *салициламид* - продлевает устранение парацетамола, что приводит к его накоплению; *ЦНС депрессорами (бензодиазепины, барбитураты, трициклические антидепрессанты, ингибиторы MAO и нейролептики)* - могут увеличить седативный эффект хлорфенирамина; *лекарства, содержащие парацетамол или кофеин.*

#### **Передозировка:**

Прежде, чем увеличить дозу, поговорить с лечащим врачом или фармацевтом! Соответствующие меры должны быть предприняты в зависимости от степени передозировки.

Симптомы передозировки парацетамола в первые 24 часа являются: тошнота, рвота, потеря аппетита и боли в желудке. Признаки повреждения печени появляются в период от 2 до 4 дней после приема токсических доз.

Симптомы передозировки кофеина, в основном, включают: дрожь, беспокойство, учащенное или нерегулярное сердцебиение, бессвязный поток мыслей и речи.

Симптомы передозировки хлорфенирамина, в основном, включают в себя: гиперемию, расширение зрачков, сухость во рту, запоры. Кроме того, могут появиться галлюцинации, нарушения координации и судороги. Аскорбиновая кислоты в виде витамина, растворимого в воде, практически не токсична и может применяться в широком диапазоне терапевтических доз. Во время использования высоких доз, может возникнуть диарея.

Если вы забыли принять Спейфлю:

Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.

#### **4. Возможные побочные эффекты.**

Как и все лекарства, Спейфлю может вызвать побочные эффекты, хотя и не у всех.

*Если вы испытываете любой из следующих серьезных последствий, немедленно прекратите приём препарата и обратитесь к врачу или фармацевту:*

- отек рук, ног, лодыжек, лица, губ и горла, что может вызвать трудности при глотании или дыхании;
- зуд, кожная сыпь, волдыри.

Возникновение таких симптомов говорит о наличии аллергии на Спейфлю. Значит, понадобится неотложная медицинская помощь или госпитализация. Все это очень редкие побочные эффекты.

*Обратиться к врачу немедленно или обратиться в отделение неотложной скорой помощи, если вы заметили:*

- повышение температуры тела, боль в горле, наличие язв и абсцессов в ротовой полости или в анальной области;
- нарушения сердечного ритма (например, быстрое или нерегулярное сердцебиение);
- желтизна кожи и белков глаз;
- трудности с мочеиспусканием;
- затрудненность дыхания.

Вышеперечисленные побочные эффекты являются серьезными и требуют немедленной медицинской помощи.

Серьезные побочные эффекты возникают редко.

*Сообщите врачу, если вы заметили:*

- затуманенное зрение или ухудшение симптомов глаукомы (повышенное внутриглазное давление),
- сухость во рту, запор, тошнота или другие нарушения органов пищеварения,
- снижение концентрации, усталость, потеря координации движений.

Все вышеперечисленные побочные эффекты являются мягкими.

Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данной инструкции, пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту.

#### **5. Как хранить Спейфлю.**

Лекарственный препарат не следует выбрасывать в канализацию бытовых отходов. Проконсультироваться с фармацевтом по поводу того, как избавиться от лекарств, которые больше не требуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

#### **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **6. Дополнительная информация.**

Что содержит лекарственный препарат?

Каждая таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит:

**активные вещества:** парацетамол 200 мг, аскорбиновая кислота 150 мг, кофеин 25 мг, хлорфенирамин maleat;

**вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кроскармеллоза натрия, коповидон, лаурилсульфат натрия, магния стеарат, гипромеллоза, макрогол 6000, тальк, титана диоксид, краситель хинолиновый желтый (E104).

#### **Форма выпуска:**

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере из ПВХ, вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.

#### **Срок годности:**

Указан на упаковке.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска:**

Без рецепта.